ALFA NEW

BIOREGOLATORE PER FRUTTIFERI, VITE, ORTICOLE, FLOREALI ED ORNAMENTALI

COMPOSIZIONE:

NAA (acido alfa-naftalenacetico) puro.....0,89% (= 10,8 g/l)
Acido Gibberellico puro.....0,45% (= 5,4 g/l)

FORMULAZIONE: Liquido solubile concentrato

REGISTRAZIONE: n° 10439 del 12/04/2000 del Ministero della Salute

CLASSIFICAZIONE: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO: ALFA NEW, è un formulato a base di fitormoni sviluppato per ottenere i migliori risultati sulle colture in termini di: sviluppo vegetativo, anticipo della fioritura e maturazione, aumento dell'allegagione, uniformità di pezzatura dei frutti e migliore pigmentazione della buccia.

COLTURA	ATTIVITÀ E MODALITÀ DI IMPIEGO	DOSE DI PRODOTTO PER ETTARO	DOSI ml/hl e VOLUMI DI ACQUA PER ETTARO
MELO e PERO	Per migliorare l'allegagione Un solo trattamento nelle fasi di inizio caduta petali	0,75 l/ha	50 - 75 ml/hl (800-1.500 l/ha)
ARANCIO, MANDARINO, CLEMENTINO e LIMONE	Per favorire l'allegagione e per migliorare pezzatura e qualità dei frutti Un primo trattamento ad inizio fioritura ripetuto a inizio caduta petali. Per l'ingrossamento dei frutti trattare dopo l'allegagione ad inizio invaiatura Effettuare al massimo 2 applicazioni per anno.	1 - 1,5 l/ha	50 – 75 ml/hl (1.500 – 2.000 l/ha)
PESCO ALBICOCCO	Per migliorare la pezzatura e la qualità dei frutti Il primo trattamento nelle fasi scamiciatura ripetuto dopo 7/8 giorni	0,75 l/ha	50 - 75 ml/hl (800-1.500 l/ha)
ACTINIDIA	Per il diradamento dei fiori secondari e migliorare la pezzatura e la forma dei frutti 1° intervento: abbozzi fiorali secondari appena visibili 2° intervento: caduta petali 3° intervento: dopo 7-10 giorni	0,75 - 1 l/ha	75 – 100 ml/hl (800- 1.000 l/ha)
VITE da VINO	Per l'allungamento del grappolo, per il diradamento degli acini, per ottenere un grappolo più spargolo e per migliorare la qualità dell'uva Intervenire con grappolino visibile 3/5 cm	0,75 l/ha	100 ml/hl (500 - 750 l/ha)
VITE da TAVOLA	Per l'ingrossamento degli acini Varietà apirene (es. Thomson, Crimson): 1° intervento acino 3-4 mm da ripetere dopo 10-15 giorni Varietà con semi (es. Italia, Vittoria): 1° intervento acino 3-4 mm da ripetere dopo 10-15 giorni	1 l/ha 0,5 l/ha	100 ml/hl (500 - 750 l/ha)
ZUCCHINO e CETRIOLO	Per favorire la fioritura, l'ingrossamento e la pezzatura dei frutti ed anticipare le raccolte Effettuare 2/3 applicazioni fogliari oppure miscelato con l'acqua di irrigazione in manichetta (drip irrigation), il primo intervento alla prima fioritura ad intervalli di 15-20 giorni.	0,5 - 0,75 l/ha	50 - 75 ml/hl (800 – 1.000 l/ha)*

"Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto"

ALFA NEW

COLTURA	ATTIVITÀ E MODALITÀ DI IMPIEGO	DOSE DI PRODOTTO PER ETTARO	DOSI ml/hl e VOLUMI DI ACQUA PER ETTARO
FRAGOLA	Per favorire la radicazione Effettuare 2 applicazioni in fertirrigazione, il primo intervento in post-trapianto il secondo in pre–fioritura Per l'anticipo delle fioriture e della raccolte Effettuare 2 applicazioni fogliari oppure miscelato all'acqua di irrigazione in manichetta (drip irrigation), il primo intervento 1 settimana prima della fioritura da ripetere dopo caduta petali/ allegazione Effettuare al massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.	0,75 - 1 l/ha	75 - 100 ml/hl (800- 1.000 l/ha)*
CARCIOFO	Per anticipare la formazione dei capolini Effettuare 2/3 applicazioni, iniziando alla formazione del primo abbozzo fiorale, ripetendo i successivi interventi ad intervalli di 15-20 giorni	1 l/ha	75 - 100 ml/hl (800- 1000 l/ha)
POMODORO, MELANZANA e PEPERONE	Per una migliorare la fioritura, allegazione e pezzatura dei frutti Effettuare 2/3 applicazioni fogliari oppure miscelato all'acqua di irrigazione in manichetta (drip irrigation), il primo intervento 1 settimana prima della fioritura da ripetere in fioritura e ad ingrossamento frutto	0,75 - 1 l/ha	75 - 100 ml/hl (800- 1.000 l/ha)*
SPINACIO (escluso le semine primaverili ed estive)	Per aumentare la biomassa fogliare Sono consigliati 1-2 applicazioni con intervallo di 10-15 giorni	0,75 l/ha	75 – 100 ml/hl (400 - 750 l/ha)
COLTURE PORTASEME (orticole e barbabietola da zucchero)	Per migliorare la salita a seme Sono consigliati 1-2 applicazioni con inizio poco prima della salita a seme da ripetere dopo 7 giorni.	0,75 - 1 l/ha	75 - 100 ml/hl (800- 1.000 l/ha)*
COLTURE FLORICOLE o ORNAMENTALI allevate in serra, in pieno campo ed in vivaio	er aumentare la radicazione, la fioritura, la dimensione dei fiori e la biomassa fogliare/legnosa Sono consigliate ripetute applicazioni fogliari o in manichetta (drip irrigation), ad intervalli di 15-20 giorni	0,75 - 1 l/ha	50 - 100 ml/hl (800- 1.000 l/ha)*

***Le applicazioni tramite "drip irrigation" si intendono con volumi d'acqua di almeno 10.000 - 15.000 l/ha**

AVVERTENZE: Il prodotto, essendo un bioregolatore, è influenzato nella sua azione dai fattori ambientali (temperatura, umidità) e dallo stato della coltura (nutrizionale, sanitario), si consiglia pertanto di intervenire su piante in buon stato fisiologico. Per favorire l'assorbimento di principi attivi, eseguire gli interventi fogliari nelle ore più fresche della giornata, comunque con temperature comprese tra i 15° e 25°C.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si applica da solo sia nelle applicazioni fogliari sia in quelle con distribuzione mediante manichetta.

FITOTOSSICITÀ: In considerazione della continua introduzione di nuove varietà di colture orticole, frutticole, floreali ed ornamentali, prima di procedere con applicazioni fogliari generalizzate, effettuare saggi di selettività su superfici ridotte di coltura.

INTERVALLO DI SICUREZZA:
60 giorni per vite
45 giorni per melo e pero
35 giorni per pesco, nettarine, albicocco 28 giorni per agrumi
21 giorni per spinacio
14 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, carciofo e fragola
7 giorni per zucchino e cetriolo
Sospendere i trattamenti a fine caduta petali per actinidia

Confezioni:
Flacone da 1 ℓ

"Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto"