Colture	Tempo di carenza	Avversità	Dose d'impiego	Note
MAIS	3 giorni	Nottue Tripidi Afdi, Cimici Piralide, Diabrotica	30 ml/ha 50 ml/ha	Trattamenti primaverili-estivi Massimo 2 applicazioni a distanza di 14 giorni
FRUMENTO	30 giorni	Nottue Tripidi Afdi Cimici	30 ml/ha 30 ml/ha 30 ml/ha 50 ml/ha	Trattamenti primaverili-estivi Massimo 2 applicazioni a distanza di 14 giorni
FRUMENTO ORZO	3 giorni	Afdi-vettori del nanismo giallo	0,3-0,5 l/ha	Trattamenti autunnali allo stadio di 1-3 foglie se necessario ripetere il trattamento dopo 15 gg. Massimo 2 applicazioni a distanza di 14 giorni
COLZA	30 giorni	Altiche, Meligete Afdi, Punteruolo	30 ml/ha 50 ml/ha	Massimo 2 applicazioni a distanza di 14 giorni
TABACCO	3 giorni	Nottue, Afdi Tripidi, Pulce	0,3-0,5 l/ha	Massimo 2 applicazioni a distanza di 14 giorni
COTONE (solo per uso tessile)	15 giorni	Nottue, Piralide Tignole, Cicaline Tripidi, Lygus	30 ml/ha	Massimo 2 applicazioni a distanza di 14 giorni
MEDICALI	15 giorni	Cavallette	0,5 l/ha	Intervenire sui nuovi ricacci, 5-10 gg. dopo lo sfalcio
FLORICOLTURA (In campo e in serra)	3 giorni	Afdi, Aleurodidi Tripidi, Cetonie Maggiolino Tortricidi del Garofano	50 ml/ha 50-100 ml/ha	Massimo 2 applicazioni a distanza di 14 giorni
VIVAI E COLTURE ORNAMENTALI (In campo e in serra)	3 giorni	Afdi, Cimice del platano Larve di lepidotteri Maggiolino	50 ml/ha	Massimo 2 applicazioni a distanza di 14 giorni
PIOPPO IN VIVAIO	3 giorni	Gemmaiola Tarlo vespa Criptorinco	50 ml/ha 100 ml/ha	Massimo 2 applicazioni a distanza di 14 giorni
PIOPPO IN PIANTAGIONE	3 giorni	Criptorinco Saperda Crisomelidi, Defogliatori	100 ml/ha 200 ml/ha 30-50 ml/ha	

EFFETTUARE AL MASSIMO 2 TRATTAMENTI CON UN INTERVALLO DI 14 GIORNI

Diluire la dose indicata di **CELL** in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro. **CELL** agisce per contatto ed ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando che la bagnatura sia la più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (ml 10-20 per 100 litri di miscela). Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamento delle foglie.

COMPATIBILITÀ: **CELL** è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di **CELL** preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione.