

CLOMET

COMPOSIZIONE

Metazaclor puro
44,3% (500 g/l)

FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

CONFEZIONI

bottiglia 1 l
tanica 5 l

CLASSIFICAZIONE ATTENZIONE



REGISTRAZIONE Min. San.
n. 14380 del 26/01/2009



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto viene assorbito prevalentemente dalle radici, e dalle plantule delle malerbe sia graminacee che dicotiledoni. In relazione a queste caratteristiche ed alla sua elevata selettività può essere impiegato sia in pre-emergenza che in post-emergenza precoce delle colture.

Colture	Infestanti	Dose d'impiego	Note
COLZA	Apera Spica-Venti Alopecurus Spp Poa Spp Echinochloa Spp Lolium Spp Setaria Spp	2 l/ha	Pre-emergenza entro il 3° giorno dalla semina. Il trattamento si può fare anche in post-emergenza precoce con la colza con le prime due foglie vere e con infestanti allo stadio di plantula
CAVOLI A INFIORESCENZA, CAVOLI A TESTA, CAVOLI A FOGLIA	Digitaria Sanguinalis Amaranthus Retroflexus Ca themis Spp Stellaria Spp Lamium Spp Chenopodium Spp	1,5-2 l/ha	In 400-500 litri di acqua per ettaro. Il trattamento si effettua subito dopo la messa a dimora della coltura e prima della crisi da trapianto. In post-trapianto si consiglia la dose più bassa.
AGLIO	Sonchus Spp Mercurialis Annua Solanum Spp Mysotis Spp Urtica Urens Papaver Spp Polygonum Persicaria Ranunculus Spp Veronica	1,5-2 l/ha	Trattare subito dopo la messa a dimora dei bulbilli o in post-emergenza quando la coltura ha sviluppato 2-4 foglie e con infestanti allo stadio di plantula