

# BELKAP EXTRA

(Polvere bagnabile)

Fungicida sistemico e di contatto ad azione preventiva e curativa contro la Peronospora della vite  
FRAC: 33+27+M4

BELKAP EXTRA Registrazione del Ministero della Salute N. 17170 del 22/02/2018

Composizione:

Fosetil Alluminio puro	g. 50,0
Cimoxanil puro	g. 4,0
Folpet puro	g. 25,0
Coformulanti q.b.a	g. 100

Contenuto: **Kg 0,5-1-5-10**

Partita n.

**PROBELTE S.A.**  
Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro  
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA  
Tel. +34 968 307 250

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

**PROBELTE S.A.**  
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO  
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA



**PERICOLO**

Distribuito da: **Chemia SpA** - Via Statale, 327 - 44047 Dosso (FE) – Tel. 0532/848477  
**Agrowin Biosciences s.r.l.** - via Montegrappa, 7 - 24121 Bergamo - Tel. 0331 440977

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H318 Provoca gravi lesioni oculari. H332 Nocivo se inalato. H351 Sospettato di provocare il cancro. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**

**PREVENZIONE:** P261 Evitare di respirare la polvere/la nebbia/gli aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.

**REAZIONE:** P304+P340 CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH208 Contiene Cimoxanil e Folpet. Possono provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Durante le fasi di miscelazione e caricamento del prodotto indossare guanti, tuta da lavoro, protezione oculare/maschera pieno facciale e protezione respiratoria (FP2/P2). Per applicazione su vite mediante trattore cabinato, indossare guanti e tuta da lavoro. Per applicazione su vite mediante trattore non cabinato, indossare guanti, tuta da lavoro con cappuccio e visiera protettiva. Per applicazione con barra irroratrice, utilizzare ugelli di fine barra 01+03 operando ad una pressione d'esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e comunque non superiore al limite massimo di 3 bar, indossare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle aeree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non effettuare operazioni di rifinitura manuale su vite prima che siano trascorsi cinque giorni dall'ultimo trattamento. Trascorsi cinque giorni, è possibile effettuare operazioni di rifinitura manuale su vite indossando i guanti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. In caso di applicazione su vite, per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 20 metri dai corpi idrici superficiali.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 50%, CIMOXANIL 4% e FOLPET 25% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

**FOSETIL ALLUMINIO –**

**CIMOXANIL –** Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

**FOLPET -** Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti e rinfaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione, possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.

**Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.**

## Caratteristiche

BELKAP EXTRA è un fungicida antiperonosporico in polvere bagnabile a base di tre sostanze attive: Fosetil alluminio, Cimoxanil e Folpet con azione sistemica e di contatto. Questa associazione conferisce al prodotto un'attività preventiva e curativa.

## Dosi e modalità d'impiego

**Vite:** contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) alla dose di 0,9-3,0 Kg/ha distribuito con volumi d'acqua di 300-1000 litri/ha, corrispondenti a 300 g/hl. Grazie alla lunga persistenza d'azione, il prodotto può essere impiegato a cadenza fissa. Effettuare massimo 3 trattamenti per anno.

Il primo trattamento deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia:

- germogli lunghi 10 cm
- pioggia di almeno 10 mm
- temperatura superiore a 10 gradi.

I successivi trattamenti devono essere effettuati a cadenza di 10-14 giorni.

Il prodotto svolge anche un'attività curativa ed è in grado di bloccare un'infezione in atto se applicato entro 2-3 giorni dall'inizio della pioggia.

**Su vite da tavola** gli interventi devono essere effettuati in pre fioritura. Non effettuare trattamenti dopo questo periodo.

## Preparazione e applicazione:

Agitare bene prima dell'uso e mantenere in agitazione la miscela anche durante l'applicazione.

## Compatibilità

Il prodotto si impiega da solo.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su uve da vino. Su uve da tavola trattamenti consentiti fino a pre fioritura.

## ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**