

Etichetta formato ridotto

METIX COMBI

Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora della vite da vino
in polvere bagnabile

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 4+M4

METIX COMBI	Registrazione Ministero della Salute n. 11041 del 11/10/2001	
COMPOSIZIONE	IQV ITALIA Srl	
100 grammi di prodotto contengono	Via del Progresso, 2	
METALAXIL, puro g. 10	00065 Fiano Romano (Roma)	
FOLPET, puro g. 40	Tel. 0765 400086	
Coformulanti q.b. a g.100	CONTENUTO: g 100	
distribuito da:		
CHEMIA S.p.A.		
Via Statale n.327 - 44047 Dosso, Terre Del Reno (Ferrara)	Partita n	
Tel. 0532-848477		
Stabilimento di produzione:		
IQV industrias Químicas del Valles s.a.		ATTENZIONE
Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)		
INDICAZIONI DI PERICOLO: H351 – Sospettato di provocare il cancro. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.		
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini.		
PREVENZIONE: P202 – Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 – Utilizzare guanti in nitrile, tuta da lavoro e apparecchio respiratorio adatto (FFP3 APF 20).		
REAZIONE: P308 + P313 – IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.		
CONSERVAZIONE: P401 – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.		
SMALTIMENTO: P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.		
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 208 – Contiene METALAXIL e FOLPET. Possono provocare una reazione allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.		

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE

METIX COMBI

Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora della vite da vino in polvere bagnabile

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 4+M4

METIX COMBI Registrazione Ministero della Salute n. 11041 del 11/10/2001

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono
 METALAXIL, puro g. 10
 FOLPET, puro g. 40
 Coformulanti q.b. a g.100

Stabilimento di produzione:

IQV industrias Químicas del Valles s.a.
 Mollet del Valles - Barcellona (Spagna)

**ATTENZIONE**

INDICAZIONI DI PERICOLO: H351 – Sospettato di provocare il cancro. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P202 – Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 – Utilizzare guanti in nitrile, tuta da lavoro e apparecchio respiratorio adatto (FFP3 APF 20).

REAZIONE: P308 + P313 – IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

CONSERVAZIONE: P401 – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 208 – Contiene METALAXIL e FOLPET. Possono provocare una reazione allergica.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

IQV ITALIA Srl

Via del Progresso, 2
 00065 Fiano Romano (Roma)
 Tel. 0765 400086

distribuito da:

CHEMIA S.p.A. - Via Statale n.327
 44047 Dosso, Terre Del Reno (Ferrara)
 Tel. 0532-848477

CONTENUTO: g 100-250-500 Kg 1-5-10-20
 Partita n

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 10% e FOLPET 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

FOLPET - Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinfaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardio-circolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il **METIX COMBI** è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la lotta contro la **peronospora della vite** (da vino). È dotato di azione bloccante ed impedisce lo sviluppo del micelio fungino se applicato subito dopo le infezioni. L'uso regolare del **METIX COMBI** consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile gli attacchi di *Botrytis cinerea*, Escoriosi e Black-rot grazie alla presenza del Folpet.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il primo trattamento deve essere eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante; per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge. Infatti anche le piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento. La traslocazione acropeta del **METIX COMBI** consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo tra un trattamento e l'altro.

Intervenire con **200 g/hl** di acqua fino ad allegagione avvenuta con intervalli cadenzati di 12 giorni.

Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione.

Per la lotta contemporanea contro l'oidio, miscelare il prodotto agli anticrittogamici previsti per questo scopo.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con polisolfuri, Tiram ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA.

Avvertenze: Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e i tempi di carenza del formulato, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO