FLANCO SC

ACARICIDA

COMPOSIZIONE
Exitiazox puro
g 24 (260 g/l)

FORMULAZIONE
Sospensione concentrata

CONFEZIONI
bottiglia 200 ml

CLASSIFICAZIONE
-

REGISTRAZIONE Min. San.
n. 16126 del 30/07/2014

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

FLANKO SC agisce per contatto sulle uova e sulle larve nei vari stadi di sviluppo dei ragnetti rossi (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae) e di quelli gialli (Eutotranychus carpini). Il prodotto possiede un'azione translaminare nelle foglie.

Colture	Tempo di carenza	Avversità	Dose d'impiego
MELO, NASCHI	28 giorni	Ragnetti rossi Ragnetti gialli	20 ml/hl
PERO, COTOGNO	28 giorni		
AGRUMI (Pompelmo, Tangelo pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola)	14 giorni		
VITE	21 giorni		
NESPOLO	28 giorni		
COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI (in campo e in serra)	34 giorni		