

HUMOSTIM 2 PLUS®

CONCIME MINERALE COMPOSTO NP CON ZINCO

COMPOSIZIONE:

AZOTO (N) TOTALE	10%
di cui	
AZOTO (N) AMMONIACALE	10%
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅)	45%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
ZINCO (Zn)	2%

FORMULAZIONE:

Microgranulare
Densità apparente 900 g/l

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO: HUMOSTIM 2 PLUS è un concime microgranulare a base di Azoto, Fosforo e Zinco totalmente solubili e prontamente assimilabili dalle piante. Il prodotto presenta una formulazione simile ai comuni geodisinfestanti, pertanto messo all'interno dei microgranulatori della seminatrice può essere localizzato con estrema precisione alla stessa maniera da solo o anche in miscela. I materiali utilizzati come supporto sono ideali per questo tipo di impiego e non sono fitotossici.

La caratteristica fondamentale del HUMOSTIM 2 PLUS è quella di consentire un rapido sviluppo iniziale delle colture specialmente in condizioni pedoclimatiche difficili (es. basse temperature, terreni calcarei, salini, poco fertili, freddi, ecc.). L'Anidride fosforica in genere e lo Zinco, dove vi sono carenze, localizzati direttamente a contatto con i semi o le radici, stimolano "l'effetto partenza" delle colture.

HUMOSTIM 2 PLUS, favorisce la divisione delle cellule meristematiche determinando uno sviluppo delle radici in lunghezza, ramificazione e peso, evitando così lo stress da trapianto o da semine precoci. Complessivamente il HUMOSTIM 2 PLUS, localizzato alla semina o al trapianto, consente di ottenere i seguenti vantaggi:

- migliore sviluppo iniziale delle colture
- migliore utilizzo degli elementi nutritivi in quanto localizzati direttamente a contatto con i semi o le radici e non distribuito su tutta la superficie
- minore distribuzione delle sostanze chimiche per ettaro
- minore inquinamento del terreno, dell'acqua e dell'ecosistema
- migliore facilità di distribuzione da parte dell'operatore e quindi maggiore resa operativa.

COLTURE

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
GIRASOLE, RISO
GRANO, COLZA, CEREALI
MAIS, SORGO
SOIA
POMODORO
TABACCO
ORTIVE IN PIENO CAMPO E SERRA
ARBOREE

TERRICCIATI
COLTURE FLORICOLE

LOCALIZZATO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO kg/ha

15-30
30-60
20-60
25-50
15-25
30-60
30-60
20-40
40-60 dopo la caduta delle foglie
o all'impianto localizzato e interrato
300-400 g/m³
20-30

Le dosi riportate possono variare in relazione alle esigenze delle colture e alla fertilità del terreno.

Densità apparente 890 - 910 g/l
pH (sol. 1%) = 7,5

Confezioni:
Sacco da 10 kg

