

# POLISOLFURO DI CALCIO



## COMPOSIZIONE

Polisolfuro di calcio  
puro 30 g (pari a  
g 22,5 di Zolfo)

## FORMULAZIONE

Liquido solubile

## CONFEZIONI

tanica 25 kg  
fusto 250 kg

## CLASSIFICAZIONE



REGISTRAZIONE Min. San.  
n. 909 del 22/02/1973



Colture	Tempo di carenza	Avversità	Dose d'impiego	Note
MELO PERO	30 giorni	Ticchiolatura Oidio	24 kg/ha 18 kg/ha 12 kg/ha	Pre-fiorali: kg 2 per hl d'acqua Post-fiorali: kg 1,5 per hl d'acqua Successivi: kg 1 per hl d'acqua
PESCO SUSINO CILIEGIO ALBICOCCO	30 giorni	Monilia Bolla Oidio	39 kg/ha 24 kg/ha 16 kg/ha	*Pre-fiorali: kg 5 per hl d'acqua Post-fiorali: kg 2-3 per hl d'acqua Successivi: kg 2 per hl d'acqua
VITE	30 giorni	Oidio	24 kg/ha 18 kg/ha 12 kg/ha	Pre-fiorali: kg 2 per hl d'acqua Post-fiorali: kg 1,5 per hl d'acqua Successivi: kg 1 per hl d'acqua
VIVAI DI FRUTTIFERI E VITE	30 giorni	Oidio dei fruttiferi	24 kg/ha 18 kg/ha 12 kg/ha  39 kg/ha 24 kg/ha 16 kg/ha	*Pre-fiorali: kg 2 per hl d'acqua (Pomacee) Post-fiorali: kg 1,5 per hl d'acqua (Pomacee) Successivi: kg 1 per hl d'acqua (Pomacee)  kg 5 per hl d'acqua (Drupacee) kg 2-3 per hl d'acqua (Drupacee) kg 2 per hl d'acqua (Drupacee)

\* Trattamenti primaverili: da ingrossamento gemme a bottoni fiorali.

## AVVERTENZE

Non somministrare con temperature superiori a 30° C.

## COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo. La sua applicazione deve comunque essere distanziata di almeno 5 giorni da un trattamento con oli minerali.