

RAVANE PLUS 100 CS

COMPOSIZIONE

Lambda-cialotrina pura
g 9,4 (100 g/l)

FORMULAZIONE

Sospensione di capsule

CONFEZIONI

bottiglia 1 l
bottiglia 0,500 l
bottiglia 0,250 l

CLASSIFICAZIONE ATTENZIONE



REGISTRAZIONE Min. San.
n. 16835 del 22/12/2016



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

RAVANE PLUS 100 CS è un insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. **RAVANE PLUS 100 CS** unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. **RAVANE PLUS 100 CS** si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. **RAVANE PLUS 100 CS** si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio ed alto volume. È importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed idoneo detergente.

Coltura	Parassiti	Dose (ml/ha)	n. trattamenti
DRUPACEE (ALBICOCCO, PESCO, NETTARINA)	Afidi (foglie non accartocciate)	100-150	1
	Mosca della frutta	150-250	1
POMACEE (MELO, PERO)	Afidi (foglie non accartocciate)	150-200	1
	Carpocapsa	150-250	1-2
	Psilla del pero	200-250	1-2
NOCCIOLO	Balanino	200-250	1
VITE	Tignola e tignoletta	250-300	1
	Cicaline	150-250	1
CEREALI (AVENA, FRUMENTO, ORZO)	Afidi	150-200	1
	Piralide	200-250	1
MAIS	Afidi	150-200	1
	Nottue	100-125	1
LATTUGA	Afidi	100-150	1-2
ZUCCHINI	Afidi	100-150	1

RAVANE PLUS 100 CS

Coltura	Parassiti	Dose (ml/ha)	n. trattamenti
POMODORO	Lepidotteri	150-200	1-3
	Afidi	100-150	1-2
	Nottue defogliatrici	100-125	1
PATATA	Dorifora	150-200	1-2
	Nottue defogliatrici	100-125	1
BRASSICACEAE (CAVOLFIORIE, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLINI DI BRUXELLES)	Lepidotteri	150-200	1
	Afidi	100-150	1
	Nottue defogliatrici	100-125	1
FLOREALI ED ORNAMENTALI	Afidi	100-150	1

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA:

Colture	Periodo di carenza
POMODORO, ZUCCHINO	3 giorni
LATTUGA, CAVOLFIORIE, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLINI DI BRUXELLES, MELO, PERO, PESCO, ALBICOCCO, NETTARINE, NOCCIOLO	7 giorni
PATATA	15 giorni
VITE	21 giorni
MAIS	28 giorni
AVENA, FRUMENTO, ORZO	30 giorni