

SINSAJO

COMPOSIZIONE

Pyriproxyfen puro
g 10,86 (100 g/l)

FORMULAZIONE

Concentrato Emulsionabile

CONFEZIONI

bottiglia 1 l

CLASSIFICAZIONE PERICOLO



REGISTRAZIONE Min. San.
n. 15948 del 11/12/2013



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

SINSAJO è un insetticida specifico per il controllo delle Cocciniglie e della Mosca Bianca delle principali colture arboree ed erbacee.

Colture	Tempo di carenza	Avversità	Dose d'impiego	Note
AGRUMI	30 giorni	Cocciniglie	50-75 ml/hl (1-1.5 l/ha)	Intervenire alla comparsa delle prime forme larvali. Massimo un trattamento all'anno.
POMACEE (MELO-PERO)		Quadraspidiatus Perniciosus	37,5-50 ml/hl (max 0.5 lt/ha)	Intervenire in pre-fioritura. Massimo un trattamento all'anno.
DRUPACEE (PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO)	21 giorni	Quadraspidiatus Perniciosus Pseudolacapsis Pentagona	37.5-50 ml/hl (0.3-0.5 lt/ha)	Allo stadio di femmina fecondata. Massimo un trattamento all'anno. Su ciliegio e albicocco solo in pre-fioritura, per le altre colture si può intervenire fino in prossimità del periodo di carenza.
POMODORO MELANZANA (IN SERRA)	3 giorni	Mosche bianche	50-75 ml/hl (0.25-0.95 l/ha)	Intervenire alla prima comparsa ed eventualmente dopo 10 giorni. Massimo due interventi.
VITE		Cocciniglie	50-75 ml/hl (0.25-0.75 l/ha)	Un solo trattamento in pre-fioritura.
OLIVO		Cocciniglie	25-30 ml/hl (0.175-0.375 l/ha)	Massimo 2 trattamenti all'anno in pre-fioritura.
ORNAMENTALI E FLOREALI		Mosche bianche Cocciniglie	50-75 ml/hl (0.25-0.75 l/ha)	In serra e in pieno campo 1 applicazione.