

SULFUR 80 WG



COMPOSIZIONE

Zolfo puro g 80
(esente da Selenio)

FORMULAZIONE

Microgranuli idrodispersibili

CONFEZIONI

astuccio 1 Kg
sacco 10 Kg
sacco 25 Kg

CLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE



REGISTRAZIONE Min. San.

n. 11977 del 27/01/2004



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

SULFUR 80 WG è uno zolfo micronizzato sotto forma di microgranuli idrodispersibili contro le forme di Oidio in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e floricoltura.

| Colture | Tempo di carenza | Avversità | Dose d'impiego | Note |
|---|------------------|--------------------------------------|----------------|---|
| AGRUMI | 5 giorni | Ticchiolatura | 200-500 g/hl | Trattamenti curativi intervenendo alla comparsa dei primi sintomi. |
| BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | 5 giorni | Oidio della Barbabietola da zucchero | 8 kg/ha | Effettuare il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuare i successivi a intervalli di 15-20 giorni. |
| BIETOLA DA COSTA, FOGLIA, ROSSA O DA ORTO | 5 giorni | Oidio | 200-500 g/hl | |
| CAVOLI | 5 giorni | Oidio | 200-500 g/hl | |
| CEREALI | 5 giorni | Oidio delle Graminacee | 8 kg/ha | Intervenire alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie del culmo. |
| CILIEGIO DOLCE E ACIDO | 5 giorni | Oidio | 200-500 g/hl | |
| CUCURBITACEE | 5 giorni | Oidio | 200-500 g/hl | |
| FLOREALI FORESTALI | | Oidio | 150-400 g/hl | Intervenire ai primi sintomi della malattia. |
| FRAGOLA | 5 giorni | Oidio | 200-500 g/hl | |
| GIRASOLE | 5 giorni | Oidio | 4-6 kg/ha | |
| ORNAMENTALI | | Oidio | 150-400 g/hl | Intervenire ai primi sintomi della malattia. |
| PATATA | 5 giorni | Oidio | 200-500 g/hl | |
| PESCO, NETTARINE PERCOCHE | 5 giorni | Oidio del Pesco | 200-500 g/hl | |
| POMACEE | 5 giorni | Oidio | 200-500 g/hl | Nei trattamenti prefiorali intervenire alla dose di 200-500 g/hl; per trattamenti in fioritura e post-fioritura utilizzare la dose di 200-300 g/hl. |
| POMODORO | 5 giorni | Oidio delle Solanacee | 200-500 g/hl | |
| SOIA | 5 giorni | Oidio | 4-6 kg/ha | |
| SUSINO | 5 giorni | Oidio | 200-500 g/hl | |
| TABACCO | | Oidio | 4-6 kg/ha | |
| VITE | 5 giorni | Oidio della Vite | 200-400 g/hl | Per trattamenti ad infezione avvenuta utilizzare alla dose di 400-500 g/hl. |
| VIVAI DI PIOPPO | | Oidio | 200-400 g/hl | Su vivai di pioppo. |