

XANILO 45 WG

COMPOSIZIONE

Cymoxanil puro 45 g

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

CONFEZIONI

astuccio 0,500 Kg

CLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE



REGISTRAZIONE Min. San.

n. 12548 del 23/12/2005



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto è un fungicida ad azione citotropica translaminare, efficace contro la peronospora; agisce per contatto sulle zoospore germinanti e, penetrando nei tessuti vegetali, è anche in grado di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

Iniziare i trattamenti preventivi non appena inizia il pericolo di infezioni peronosporiche. Viste le peculiari modalità di azione del prodotto (citotropicità, curatività) è sempre consigliabile usarlo in miscela con prodotto di contatto e/o endoterapici a diverso meccanismo e modalità d'azione. Per cipolla trattare fino alla fase di metà delle piante con foglie coricate e per carciofo trattare fino alla fase di raggiungimento del 50% della massa fogliare.

| Colture | | Dose g/hl | Dose g/ha | Max N° applicazioni | Min. N° gg tra applicazioni |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| VITE | | 30-35 | 300-330 | 4 | 7 |
| PATATA | | 30-35 | 300-330 | 5 | 7 |
| POMODORO, MELANZANA | Pieno campo | 30-35 | 300-330 | 5 | 7 |
| | Serra | 30-35 | 300-330 | 5 | 7 |
| MELONE, ANGIURIA, ZUCCA | Pieno campo | 30-40 | 300-400 | 4 | 8 |
| ZUCCHINO, CETRIOLO | Pieno campo | 30-40 | 300-400 | 4 | 8 |
| | Serra | 25-30 | 270 | 4 | 8 |
| LATTUGHE | Pieno campo | 30-40 | 300-400 | 4 | 8 |
| SPINACI | Pieno campo | 30-40 | 300-400 | 4 | 8 |
| CIPOLLA | Pieno campo | 30-40 | 400-500 | 4 | 8 |
| CARCIOFO | Pieno campo | 30-40 | 300-400 | 4 | 8 |

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Per garantire una migliore efficacia del prodotto, si consiglia di acidificare la soluzione a valori di pH compresi tra 5 e 6. Qualora si utilizzino apparecchiature a basso volume impiegare la dose di prodotto per ettaro che si impiegherebbe con attrezzatura a volume normale.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida.

Si sconsiglia di usarlo in associazione a prodotti con reazione alcalina ed oli minerali. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

GESTIONE DELLE RESISTENZE: Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare XANILO 45 WG ad altri fungicidi.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti: 28 giorni prima della raccolta per vite; 14 giorni prima della raccolta per carciofo; 11 giorni prima della raccolta per melone, anguria, zucca, 10 giorni prima della raccolta per lattughe, spinaci e cipolla; 7 giorni prima della raccolta per patata; 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, zucchini, cetriolo.