

**COMPOSIZIONE**

Fosfonato di potassio  
54,5 g (790 g/l)

**FORMULAZIONE**

Liquido solubile

**CONFEZIONI**

tanica 5 l

**CLASSIFICAZIONE**

PERICOLO

**REGISTRAZIONE Min. San.**

n. 16608 del 08/02/2022

**CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO**

**FOSIKA** è un fungicida sistemico e di contatto per l'impiego su vite, arancio, pompelmo e olivo per il controllo della peronospora e di altre malattie fungine.

**Vite da tavola e da vino:** contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) iniziare i trattamenti, quando si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, a partire dal termine dello sviluppo delle foglie (BBCH > 20) e proseguirli ad intervalli di 10 giorni fino in prossimità della raccolta.

Dosi di impiego: 0,75-2,5 L/ha, corrispondenti a 250 ml/hL di prodotto distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 L/ha.

Numero massimo di trattamenti consentiti per anno: 3

**Arancio e pompelmo:** contro Peronospora (*Phytophthora* spp.) iniziare i trattamenti, quando si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, a partire dal termine di accrescimento dei germogli (BBCH > 40), e proseguirli ad intervalli di 20 giorni fino in prossimità della raccolta.

Dosi di impiego: 1,5-7.5 L/ha, corrispondenti a 150-250 ml/hL di prodotto distribuiti con volumi d'acqua di 1000-3500 L/ha.

Numero massimo di trattamenti consentiti per anno: 2

**Olivo:** contro Occhio di pavone (*Cycloconium oleaginum*) effettuare un trattamento in inverno e due trattamenti in primavera distanziati di 10 giorni. Iniziare i trattamenti a partire dal termine dello sviluppo delle prime foglie (BBCH > 20).

Dosi di impiego: 1,2-2,5 L/ha, corrispondenti a 150-250 ml/hL di prodotto distribuiti con volumi d'acqua di 800-1000 L/ha.

Numero massimo di trattamenti consentiti per anno: 3

**COMPATIBILITÀ**

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER VITE, ARANCIO, POMPELMO E OLIVO.**