

# PIMIENTO 600

NOVITÀ

## COMPOSIZIONE

2,4 D sale dimetilamminico  
g 59,9 (= 720 g/l) pari a  
g 49,8 (= 600 g/l) di 2,4 D acido

## CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



## FORMULAZIONE

Concentrato solubile

## CONFEZIONI

bottiglia 1 ℓ  
tanica 5 ℓ

## REGISTRAZIONE Min. San.

n. 10221 del 09/12/1999



## CARATTERISTICHE

**PIMIENTO 600** è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici. Non essendo volatile riduce al minimo il rischio di danneggiare le colture sensibili vicine.

### Erbe infestanti sensibili a PIMIENTO 600:

*Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Ranunculus arvensis* (Ranuncolo dei campi), *Chenopodium album* (Farinello comune), *Sonchus arvensis* (Grespino dei campi), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa pastore comune), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Vicia spp.* (Veccia).

### Erbe infestanti mediamente sensibili a PIMIENTO 600:

*Plantago spp.* (Plantaggini), *Anagallis arvensis* (Centocchio), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Taraxacum officinale* (Soffione), *Urtica urens* (Ortica minore), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Rumex acetosella* (Acetosa minore), *Euphorbia helioscopia* (Erba calenzuola), *Vicia angustifolia* (Veccia), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga).

## DOSI - EPOCHE - MODALITÀ D'IMPIEGO

### FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE

**Epoca d'impiego:** su cereali (frumento, orzo, avena, segale) dall'inizio dell'accostamento alla fine della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita. PIMIENTO 600 si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi comprese tra **0,6 e 1,2 litri per ettaro**. Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti mediamente sensibili.

**Volume d'irrorazione: 200-600 L/ha**

## IN TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO ALL'ANNO

## COMPATIBILITÀ

**PIMIENTO 600** non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

## FITOTOSSICITÀ

**PIMIENTO 600** non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con **PIMIENTO 600** devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

## RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

## INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti **60 giorni** prima della raccolta.